

داروشناسی  
Pharmacology

ترازوسین هیدروکلراید  
Terazosin Hydrochloride



دکتر آزیمته کازرونی زند

احتمال وقوع هیپوتانسیون وضعیتی وجود دارد. به طور معمول این عارضه بین ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت پس از مصرف دارو مشاهده می شود. همچنین ممکن است در این زمان کلاپس و سرگیجه هم اتفاق بیفتد. اگر دارو برای مدت چند روز قطع شود، درمان باید دوباره

«ترازوسین» یک بلوک کننده انتخابی و محیطی گیرنده های آدرنژیک پس سیناپسی بوده و مدت اثر آن از پرازوسین طولانی تر است. ترازوسین در فهرست دارویی ایران به شکل قرص های ۲ و ۵ میلی گرمی موجود است. موارد مصرف ترازوسین

• پرفشاری خون: ترازوسین باعث گشاد شدن عروق و کاهش مقاومت محیطی می شود اما اثر بسیار کمی بر روی برون ده قلبی دارد. مصرف مداوم این دارو باعث تاکی کاردی رفلکسی نمی شود. همچنین این دارو بر روی جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی اثر ندارد.

• هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH): علامتی: ترازوسین با شل کردن عضلات صاف گردن مثانه و پروستات باعث کاهش مقاومت راه خروجی مثانه و مقاومت و فشار مجرای ادراری می شود که نتیجه آن بهبود جریان و خروج ادرار است.

مقدار و نحوه مصرف ترازوسین  
• پرفشاری خون: در آغاز ۱ میلی گرم هر شب هنگام خواب؛ سپس می توان دوز دارو را به تدریج بر اساس پاسخ بیمار افزایش داد. به طور معمول دوز مصرفی ۵-۱ میلی گرم و یک بار در روز است. اگر اثر ضد فشار خونی دارو به مدت ۲۴ ساعت باقی نماند، می توان آن را در دو دوز منقسم مصرف کرد. حداکثر دوز توصیه شده روزانه ۲۰ میلی گرم است.


• BPH علامتی: در آغاز ۱ میلی گرم هر شب هنگام خواب؛ سپس دوز مصرفی به صورت تدریجی از ۲ به ۵ و از ۵ به ۱۰ میلی گرم در روز تا رسیدن به نتیجه مطلوب درمانی افزایش می یابد. بیشتر بیماران برای رسیدن به پاسخ مطلوب به ۱۰ میلی گرم دارو یک بار در روز برای مدت حداقل ۴-۷ هفته نیاز دارند. حداکثر دوز روزانه ۲۰ میلی گرمی است.

نکته: فواصل افزایش دوز باید حداقل ۷ روز باشد. موارد احتیاط مصرف ترازوسین  
• قبل از شروع مصرف ترازوسین برای موارد BPH علامتی باید احتمال وجود کارسینوم پروستات به طور کامل رد شود.  
• طی هفته اول درمان با ترازوسین و پس از هر افزایش دوز،

تصویر پزشکی




دکتر فرهاد منتظری  
حلقه Kayser-Fleicher



حلقه Kayser-Fleicher تغییر رنگ بخش خارجی عنبیه (فلش ها) است که در بیماری ویلسون و به علت رسوب مس در Descement's membrane ایجاد می شود. رنگ این حلقه می تواند قهوه ای روشن، نارنجی و یا خاکستری باشد.  
منبع: <http://www.gourmandizer.com/wilsons/index.html>

جدیدترین



دکتر هانیه بزرگری خانقاه  
Zyrtec

سازمان غذا و داروی آمریکا موسوم به (FDA)، داروی «Zyrtec» را به منظور تسکین موقتی علائم ناشی از تب یونجه و دیگر آلرژی های تنفسی به صورت نسخه نشده (nonprescribed) برای استفاده کودکان و بزرگسالان تأیید کرد.  
Zyrtec cetirizine HCl به اشکال دارویی قرص، قرص جویدنی و شربت تولید می شود. این دارو برای تسکین عطسه، آبریزش بینی، خارش و اشک ریزش چشم ها، خارش حلق و بینی در بزرگسالان و کودکان بالای دو سال قابل استفاده است و در کودکان شش ساله و بزرگتر از آن و در بزرگسالان برای تسکین خارش ناشی از کبیر (به صورت نسخه نشده) مجوز مصرف دارد.  
بقیه در صفحه ۷

مسابقه علمی طبیب



مسابقه شماره ۱۳۵

- ۱- کدام یک از موارد زیر از عوارض و علائم بیماری کازازاکی نیست؟  
(۱) انفارکتوس قلبی  
(۲) بزرگی و تورم کیسه صفرا  
(۳) کونژنکتیویت چرکی  
(۴) اریتم کف دست و پا

۲- مهم ترین عامل ایجاد گاستروآتریت و کم آبی در کودکان کدام یک از عوامل زیر است؟

- (۱) روتاویروس  
(۲) ادنویروس  
(۳) استرو ویروس  
(۴) وروس Norwalk

علاقه مندان به شرکت در مسابقه می توانند برای پاسخ گویی حداکثر تا ۱۰ دی ماه ۱۳۸۶ با آدرس پست الکترونیکی [info@teimourzadeh.com](mailto:info@teimourzadeh.com) مکاتبه و یا با شماره ۸۸ ۸۹ ۵۸ ۵۹ تماس گرفته پس از ذکر شماره مسابقه، شماره سؤال و پاسخ خود را اعلام کنند. در نهایت نام و شماره تلفن تماس خود را نیز بفرمایید.  
در هر مسابقه، از بین کسانی که به همه سؤال ها پاسخ صحیح بدهند، از سوی انتشارات تیمورزاده به قید قرعه به ۳ نفر هدایایی تقدیم خواهد شد.

جوایز عبارتند از: یک عدد نیم سکه بهار آزادی، یک عدد ربع سکه بهار آزادی و یک جلد درنامه ایران فارما.

پاسخ مسابقه شماره ۱۱ در صفحه ۶ آمده است

برنامه سخنرانی های موزه ملی تاریخ علوم پزشکی در دی ماه سال ۱۳۸۶			
عنوان	سخنران	تاریخ	ساعت
۱- طب ورزش در مکتب طب سنتی ایران	دکتر مهرداد کریمی	۸۶/۱۰/۱۳	۱۱-۱۰
۲- رابطه که جهان و مه جهان	دکتر هما سادات افسری	۸۶/۱۰/۲۰	۱۱-۱۰

نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) - کوچه مدرسه - موزه ملی تاریخ علوم پزشکی - تلفن: ۸۸۳۲۸۵۵۷ - <http://Museum.tums.ac.ir>

**CLOPIDEX®**  
CLOPIDEX  
گلوپید و گول  
مهار کننده تجمع پلاکتی

موارد مصرف و دوزها:

بیماری حاد عروق کرونر ( Acute Coronary Syndrome ) شامل ( Non-Q-wave MI ) / ( Unstable Angina )  
دوز اولیه: ۳۰۰ میلی گرم گلوپیدوگول + آسپیرین  
دوز نگهدارنده: ۷۵ میلی گرم گلوپیدوگول یک بار در روز + آسپیرین  
در سکنه مغزی اخیر یا بیماری های عروقی محیطی  
دوز نگهدارنده: ۷۵ میلی گرم گلوپیدوگول یک بار در روز

مزایا:

رژیم درمانی گلوپیدوگول توام با آسپیرین در مقایسه با تیکلوپیدین و آسپیرین بهتر توسط بیمار تحمل می شود.  
مطالعات نشان داده است که خطر رویدادهای کاردیو واسکولار در بیمارانی که گلوپیدوگول و آسپیرین مصرف می کنند در مقایسه با بیمارانی که تنها آسپیرین مصرف می کنند، کمتر می شود.  
گلوپیدوگول دارای عوارض جانبی کمتری نسبت به آسپیرین می باشد.

درصد عوارض جانبی	گلوپیدوگول ۷۵mg N=۱۵۹۱	آسپیرین ۳۰۰mg N=۱۵۹۱
خونریزی گوارشی	۲	۲/۷
بستری شدن در بیمارستان به علت خونریزی گوارشی	۰/۲	۱/۱
زخم های گوارشی	۰/۲	۱/۲
خونریزی های درون حجمه ای	۰/۴	۰/۵

گلوپیدکس به شکل قرص روکش دار ۷۵ میلی گرم در جعبه های ۳۰ عددی توسط شرکت توزیع دارو پخش در داروخانه های سراسر کشور عرضه می گردد.

Elixir of life

کپسول ۲۵۰ میلی گرمی در جعبه ۱۰۰ عددی  
توزیع توسط شرکت توزیع دارو پخش

**URSODEX®**  
Ursodeoxycholic acid

**ارسودکس®**  
حل کننده سنگ صفراوی

Ursodex® . موثر در پیشگیری از تشکیل سنگ کیسه صفرا  
Ursodex® . موثر در درمان سنگ کیسه صفرا  
Ursodex® . موثر در درمان سیروز صفراوی  
Ursodex® . این دارو از طریق سیستم گوارشی جذب و سنتز و ترشح کلسترول توسط کبد را مهار کرده و مانع جذب روده ای کلسترول می شود.

دوزها مصرفی:

پیشگیری از تشکیل سنگ کیسه صفرا:  
۲۵۰ میلی گرم دوبار در روز همراه غذا  
درمان سنگ کیسه صفرا:  
روزانه ۸ تا ۱۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در دو یا سه نوبت همراه غذا  
سیروز صفراوی:  
۱۲ تا ۱۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در ۲ تا ۴ نوبت همراه غذا

آنتی کولیتیک (Anti Cholelithic)  
**Ursodex® (Ursodeoxycholic Acid), Capsule 250mg**

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ولی عصر، کوچه شهید رحمتی، شماره ۱۵  
سندوق پستی: ۳۷۹-۱۳۳۵ - کدپستی: ۱۵۹۲۹ - تلفن گویا: ۸۸۹۱۰۹۱۰ - تلفن: ۷-۰۷۷-۸۸۹۱۸۴۶۶ - شماره: ۸۸۸۹۹۳۵۸  
[www.exirpharma.com](http://www.exirpharma.com) [info@exirpharma.com](mailto:info@exirpharma.com)