



جدیدترین

دکتر هانیه برزگری خانقاه

topiramate

FDA مصرف قرص topiramate برای درمان صرع تأیید کرد. این محصول در حال حاضر به صورت کپسول های ۱۵ mg، ۲۵ mg و ۵۰ mg موجود است. مکانیسم اثر ضد تشنج آن به درستی مشخص نشده اما شاید با اثر بر کانال های سدیم سلول، اثر بر رستپورهای GABA یا رستپور گلو تامات تأثیرش را اعمال کند. جذب این دارو سریع و نیمه عمر آن ۱۲ ساعت است. در افرادی که عملکرد کلیوی نرمال دارند، ظرف ۴ روز آثار درمانی اش آغاز می شود. برای درمان Partial Seizure مناسب است و می تواند با داروهای ضد صرع دیگر به طور همزمان استفاده شود. مصرف آن باید به تدریج آغاز (روزها به تدریج افزایش یابد) و به تدریج کاهش یابد. کاهش فعالیت سیکو موترور، اختلال در تمرکز، مشکلات کلامی، خواب آلودگی و خشکی ممکن است در اثر مصرف این دارو رخ دهد. در بارداری جزء گروه C طبقه بندی می شود. اثر آن در شیردهی و اطفال ناشناخته است. در سالمندان قابل استفاده می باشد ولی باید به مضرات کلیوی دارو توجه کرد. دوز پیشنهادی ۴۰۰ mg در روز در ۲ دوز منقسم است.



توصیه های مصرف ترکیبات اکالیپتوس

- در دوران بارداری یا شیردهی از مصرف اکالیپتوس پرهیز کنید. انجمن فرآورده های گیاهان دارویی آمریکا برگ اکالیپتوس را از نظر بی خطری در دوران بارداری در کلاس A ارزیابی کرده است.

- افرادی که مبتلا به زخم معده (PUD) یا زخم اثنی عشر (DUD) هستند، باید از مصارف خوراکی و عصاره برگ اکالیپتوس اجتناب کنند.

- هر گونه آسیب کبدی، بیماری های مرتبط با کبد و بروز آسیب در بیمار از جمله سایر ممنوعیت مصرف ترکیبات اکالیپتوس هستند که باید بدان توجه شود.

- استفاده از هر گونه ترکیبات اکالیپتوس در کودکان زیر ۲ سال هم ممنوعیت مصرف دارد.

اکالیپتوس گیاه بومی از کشور استرالیاست و در این قاره غذای اصلی خرس های کوآلا به شمار می رود. این گیاه گونه های فراوانی دارد و برخی از گونه های آن به اندازه گل های تزئینی و برخی به اندازه یک درخت تنومند است. شناخته شده ترین گونه اکالیپتوس، درخت تب استرالیا یا اکالیپتوس لته آبی است که مصارف پزشکی هم دارد. ارتفاع این گیاه به ۳۳۰ متر می رسد و برگ های ۴ تا ۱۲ اینچی این گیاه دارای رنگ سبز تند و براق هستند. وقتی پوسته خاکستری - آبی این گیاه کنده می شود، زیر آن پوسته کرم رنگی به چشم می خورد که نمای جذابی به گیاه می بخشد.

پاره های از ترکیبات گیاهی:

سیننول عنصر فعالی است که در روغن اکالیپتوس وجود دارد و بسیاری از اثرات درمانی این گیاه که در ادامه گفته می شود، به دلیل وجود همین ترکیب است. ایزوفلاوونیدهای این گیاه هم از جمله نقاط قوت اکالیپتوس به شمار می رود که با تکنیک های تقطیر و خالص سازی ترکیبات گیاهی عصاره های شفابخشی پدید می آید که در ادامه می توانید بیشتر با آنها آشنا شوید.

اشکال موجود:

اشکالی از اکالیپتوس که هم اکنون در بازارهای جهانی به چشم می خورند، بیشتر شامل روغن مایع، پماد تنتوربرگ (محلول تهیه شده از گیاه و الکل یا آب)، برگ خام و جای هستند. قطره های ضد سرده، انواع شربت ها، مایعات تبخیر کننده، روغن های مالیدنی، انواع خمیر دندان و مواد شست و شوی دهان حاوی روغن اکالیپتوس با ترکیب اصلی آن یعنی سیننول است.

موارد مصرف اکالیپتوس:

عصاره های شفابخش این گیاه برای درمان علائم و عوارض عفونت های تنفسی فوقانی و تحتانی بسیار مورد



بروز تشنج متعاقب استفاده از لیدوکائین غیر مجاز جهت انجام ختنه

اکالیپتوس

سوغاتی از سرزمین کانگوروها

Eucalyptus



کمت کسی را می توان پیدا کرد که نام اکالیپتوس به گوشش بخورد و این نام او را به سرزمین رویایی کانگوروها یا همان استرالیا نبرد. اهالی این سرزمین می دانستند که اگر در منطقه ای بی آب و علف گیر بیفتند، می توانند ریشه های این گیاه را که آکنده از آب است، برای رفع تشنجی از زمین بیرون بیاورند و آن را بخورند.

به اطلاع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها، شش مورد گزارش مبنی بر بروز تشنج شدید متعاقب تزریق موضعی لیدوکائین جهت انجام ختنه نموده است. در پنج مورد از گزارش های دریافتی، لیدوکائین مورد استفاده دارای برچسب شرکت Panther انگلیس بر روی ویال است که داروی قاچاق و تقلبی محسوب می شود. این پنج مورد، شیرخواران سه الی پنج ماهه ای هستند که پس از تزریق زیرجلدی از ویال مذکور دچار تشنج شده اند. مورد ششم شیرخوار سه ماهه ای است که

استفاده قرار می گیرد. عفونت هایی همچون فارنژیت، لارنژیت و پنومونی های باکتریال از جمله این بیماری ها هستند. یکی دیگر از موارد بسیار زیاد مصرف ترکیبات روغنی این گیاه، تسکین دردهای روماتیسمی است که به صورت روغن های مالیدنی روی مفاصل استعمال می شود. به دلیل مصارف خودسرانه این گیاه، توصیه اکید می شود که قبل از مصرف میزان کم یا هر میزان مصرف این گیاه با پزشک معالج مشاوره صورت گیرد.

دوزاژ مصرف ترکیبات اکالیپتوس

- جوشانده برگ اکالیپتوس (برای رفع Congestion): ۱ تا ۱/۵ میلی لیتر روزانه
- روغن برای مصارف موضعی (برای مفاصل متورم): ۳۰ میلی لیتر روغن اکالیپتوس به ۵۰۰ میلی لیتر آب اضافه شود و سپس مصرف گردد.
- اکالیپتوس: روزانه ۱/۵ تا ۲ میلی لیتر برای هر لیوان آب جوش

تداخل های احتمالی

یکی از مهم ترین تداخلات دارویی ترکیبات خوراکی اکالیپتوس با داروهای افزایش قند همچون هورمون های گلوکاکن یا ترکیبات دارویی مرتبط با آن است. دلیل این امر مهار اثرات دارویی آنها به وسیله ترکیبات اکالیپتوس است که اگر بیماری مبتلا به حملات هایپوگلاسمی باشد، مصرف این گونه ترکیبات می تواند برای آنها خطر ساز باشد و آنها را به فاز مقاومت به این گونه داروها و حملات هایپوگلاسمیک شدید ببرد.

www.AvomaWeb.com
www.Vitacast.com
www.evitamins.com
www.Aromatherapy house.com
گردآوری: دکتر شیرین فرجی گودرزی

به دنبال تزریق موضعی لیدوکائین جهت انجام عمل ختنه دچار epileptic Status گشته، پس از پنج روز علی رغم دریافت اقدامات درمانی فوت نموده است. در مورد اخیر مشخصات لیدوکائین مورد استفاده نامعلوم است. با توجه به اینکه لیدوکائین ساخت شرکت Panther فاقد مجوز بوده و قطعاً داروی قاچاق و تقلبی محسوب می شود، اکیداً توصیه می شود که از استفاده و تزریق ویال مذکور خودداری شود. بدیهی است اقدامات قانونی برای شناسایی عوامل ورود و توزیع داروی مذکور در حال انجام است.



نسخه

دکتر هانیه برزگری خانقاه

اونیت خارجی

- ۱) پاکسازی گوش با استفاده از دستگاه مکنده یا اپلیکاتور
- ۲) معاینه مجرا و پرده صماخ (پرده نباید سوراخ باشد)
- ۳) تمیز کردن مجرا با محلول اسیدی (اسیداستیک ۴-۲ درصد) یا آنتی سپتیک
- ۴) آنتی بیوتیک موضعی ۳-۴ بار در روز (در صورت تورم مجرا در روزهای اول از تکه های پنبه یا مژ استفاده شود).
- ۵) آنتی بیوتیک سیستمیک به مدت ۱۰ روز در صورت تب و لنفادنوپاتی
- ۶) اگر مجرای گوش حالت اگزوماتو یا ترشح دار داشته باشد، محلول بارو (Burow) یا استات آلومینیوم ۵ درصد مؤثر است. اگر لاله گوش گرفتار باشد، با گاز آغشته به محلول استات آلومینیوم کمپرس می کنیم.
- ۷) استفاده از مسکن خوراکی
- ۸) تکرار و کنترل این روند هر ۳ تا ۳ روز تا تمیز شدن کامل مجرا
- ۹) در صورت عدم بهبودی در عرض ۴۸ ساعت و نیز عود عفونت باید کشت تهیه شود.
- ۱۰) از ورود آب و آلودگی ها به گوش جلوگیری کرده و پس از استحمام، گوش حتماً خشک شود.

نسخه پیشنهادی

- R/
- 1- Otic drop Polymyxin B هر ۶ ساعت ۴ قطره
 - 2- Drop Betamethazon هر ۶ ساعت ۴ قطره
 - 3- Tab Erythromycin 400 mg هر ۶ ساعت یک عدد
 - 4- Tab Acetaminophen codein هر ۸ ساعت یک عدد

www.exirpharma.com

مولتی سانستول

برای همه شیشه های شربت ۲۰۰ گرمی

ترکیبی متعادل و خوش طعم از ویتامینها همراه با کلسیم

مولتی سانستول

تمامی ۹ ویتامین ضروری (ویتامین A/D3/B1/B2/B6/C/E/نیوکوتین آمیدوپانتول) و کلسیم پایه را طی دوران رشد و نمو کودک فراهم می کند.

مولتی سانستول

برای تمامی گروههای سنی حتی در دوران حاملگی و شیردهی نیز مناسب میباشد.

مولتی سانستول

در موارد زیر مناسب است:

- بهبود شکل گیری استخوان و دندان
- افزایش مقاومت در برابر عفونتهای حاد و مزمن
- رهایی از خستگی بعد از فعالیت های ذهنی و فیزیکی
- کاهش طول دوره ی بیماری
- اختلالات رشد
- کمبود اشتها
- راشیتیس
- سوء تغذیه و کم خونی
- کاهش تمرکز و خستگی در مدرسه
- اختلالات متابولیسم

مقدار مصرف:

- کودکان بین ۵-۲ سال: روزانه ۳-۲ قاشق مرباخوری
- کودکان بزرگتر و بالین: روزانه ۴-۳ قاشق مرباخوری

دکتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، پلاک ۲۷ میدان ولیعصر
کوبه فهدرحمتی، شماره ۱۵، کدپستی ۱۵۱۳۹، پ. م ۳۷۹-۱۳۳۵
تلفن: ۰۲۱-۸۹۱۸۶۶۱-۶۷ / ۰۲۱-۸۹۱۳۶۵۸-۴۱

EXIR PHARMACEUTICALS

Under License of ALTANA PHARMA

سلامتی توانایی رشد شادابی

اکسی بکت ۱۱

Exiject

تزریق بدون درد دیگر رویا نیست

www.exirdiabetes.com

- سهولت تزریق انسولین در اطفال و بالین توسط خود فرد
- سهولت تزریق هورمون رشد در اطفال توسط خود فرد
- کاهش اضطراب اطفال هنگام تزریق بدلیل مخفی بودن سوزن
- سهولت تزریق در سالخوردگان دچار لرزش دست
- پیشگیری از عوارض ناشی از تزریق نادرست با تنظیم عمق تزریق
- سهولت تزریق هنگام سفر
- تزریق زیر جلدی، با عملاتی چهارین، اینترفرون، آدرنالین و تعداد زیادی از داروهای دیگر
- برای استفاده از ۱ کمی جکت از سرنگ هایی که سر سوزن به سرنگ اتصال دارد (Field needle) در اندازه های ۵۰ و ۱۰۰ واحدی استفاده کنید

با ضمانت نامه شرکت داروسازی اکسیر یک سال ضمانت تعمیر و یا تعویض دستگاه

EXIR PHARMACEUTICALS

مراکز فروش: کلیه داروخانه ها و فروشگاه های تجهیزات پزشکی سراسر کشور
تلفن: ۸۸۹۴۱۵۴۲ / فاکس: ۸۸۹۴۱۵۴۲
تلفن نمایندگی فروش: ۸۸۹۱۸۶۷۱